

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)
Калужский филиал ПГУПС**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

_____ А.В. Полевой

«27» июня 2022 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

для специальности

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Квалификация – **Техник**

вид подготовки - базовая

Форма обучения - очная

Калуга
2022

Рассмотрено на заседании ЦК
Математических и естественно-научных
дисциплин
протокол № 11 от «27» июня 2022г.
Председатель _____/Фролова Е.А./

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и рабочей программы учебной дисциплины Прикладная математика

Разработчик программы:

Макаренко Е.Ю., преподаватель Калужского филиала ПГУПС

Рецензенты:

Калинкина Г.Е., преподаватель Калужского филиала ПГУПС (*внутренний рецензент*)

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4
2	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ	6
3	ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1	ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ	10
3.2	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ	17
4	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ	32
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	35

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Прикладная математика обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство для базового вида подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования.

Объектами контроля и оценки являются умения, знания, общие и профессиональные компетенции:

Объекты контроля и оценки	Объекты контроля и оценки
У1	<i>применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для решения профессиональных задач</i>
У2	<i>применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в профессиональной деятельности</i>
У3	<i>использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях</i>
З1	<i>основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических устройств</i>
З2	<i>способы решения прикладных задач методом комплексных чисел</i>
ОК 01	<i>Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес</i>
ОК 02	<i>Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество</i>
ОК 03	<i>Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность</i>
ОК 04	<i>Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития</i>
ПК 1.1	<i>Выполнять различные виды геодезических съемок</i>
ПК 1.2	<i>Обрабатывать материалы геодезических съемок</i>
ПК 3.1	<i>Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, поездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути</i>
ПК 4.1.	<i>Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути,</i>

	<i>искусственных сооружений</i>
--	---------------------------------

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является *экзамен.*

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций:

Результаты обучения: умения, знания, общие и профессиональные компетенции	Форма контроля и оценивания
Умения:	
У 1. <i>применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для решения профессиональных задач</i>	<ul style="list-style-type: none"> - устный опрос; - письменный опрос; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - экзамен.
У 2. <i>применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в профессиональной деятельности</i>	<ul style="list-style-type: none"> - устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - экзамен.
У 3. <i>применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в профессиональной деятельности</i>	<ul style="list-style-type: none"> - устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - экзамен.
Знания:	
З1 <i>Знать основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических устройств</i>	<ul style="list-style-type: none"> - устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - экзамен.
З 2. <i>Знать способы решения прикладных задач методом комплексных чисел</i>	<ul style="list-style-type: none"> - устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - дифференцированный зачет; - экзамен.

Общие компетенции:	
ОК 01. <i>Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес</i>	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - дифференцированный зачет; - экзамен.
ОК 02. <i>Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество</i>	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - дифференцированный зачет; - экзамен.
ОК 03 <i>Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность</i>	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - экзамен.
ОК 04 <i>Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность</i>	- устный опрос; - письменный опрос; - тесты; - самостоятельная работа; - контрольная работа; - практическое занятие; - экзамен.
Профессиональные компетенции	
ПК 1 <i>Выполнять различные виды геодезических съемок</i>	- практическое занятие; - экзамен
ПК 1.2 <i>Обрабатывать материалы геодезических съемок</i>	- практическое занятие; - экзамен
ПК 3.1 <i>Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, поездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути</i>	- практическое занятие; - экзамен
ПК 4.1 <i>Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений</i>	- практическое занятие; - экзамен

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Предметом оценки служат умения, знания, общие и профессиональные компетенции, формирование которых предусмотрено ФГОГС СПО по дисциплине ЕН.01 Прикладная математика

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам и темам:

Элементы учебной дисциплины	Формы и методы контроля			
	Текущий контроль		Промежуточная аттестация	
	Форма контроля	Проверяемые У, З, ОК, ПК	Форма контроля	Проверяемые У, З, ОК, ПК
Тема 1.1. Комплексные числа.	Устный опрос Самостоятельная работа Практическая работа	У1; У2; У3 З2; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2; ПК3.1; ПК4.1	<i>экзамен</i>	
Тема 2.1. Теория множеств	Устный опрос Практическая работа Контрольная работа	У1; У2; У3 З2; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4;		
Тема 3.1. Дифференциальное и интегральное исчисление	Устный опрос Письменный опрос Самостоятельная работа Контрольная работа Практическая работа	У1; У2; У3 З2; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2; ПК3.1; ПК4.1		
Тема 3.2. Обыкновенные дифференциальные	Устный опрос Письменный опрос Практическая работа	У1; У2; У3 З2; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2;		

уравнения		ПК3.1; ПК4.1		
Тема 3.3. Дифференциальные уравнения в частных производных	Устный опрос Тесты	У1; У2; У3 32; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2; ПК3.1; ПК4.1		
Тема 3.4. Ряды	Устный опрос Контрольная работа Тест Практическая работа	У1; У2; У3 32; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2; ПК3.1; ПК4.1		
Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики	Устный опрос Контрольная работа Письменный опрос Практическая работа	У1; У2; У3 32; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2; ПК3.1; ПК4.1		
Тема 5.1. Численное интегрирование	Устный опрос Письменный опрос Контрольная работа	У1; У2; У3 32; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2; ПК3.1; ПК4.1		
Тема 5.2. Численное дифференцирование	Устный опрос Контрольная работа	У1; У2; У3 32; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2; ПК3.1; ПК4.1		
Тема 5.3. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений	Устный опрос Контрольная работа	У1; У2; У3 32; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК.4; ПК.1; ПК.1.2; ПК3.1; ПК4.1		

1.2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

УСТНЫЙ ОПРОС

1. Описание

Устный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце изучения раздела/темы.

На проведение опроса отводится 45 минут.

2. Критерии оценки устных ответов

Оценка «5» «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.

Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «2» «неудовлетворительно» - Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками.

2. Примерные вопросы

Тема	Вопросы
Тема 1.1 Комплексные числа	<i>1. Что называется комплексным числом? 2. Как записать комплексное число в алгебраической форме? 3. Что называется действительной и мнимой частями комплексного числа? 4. Какие числа называются чисто мнимыми? 5. В каком случае два комплексных числа называются сопряженными? 6. Какие операции вводятся на множестве комплексных чисел? 7. По каким правилам производятся арифметические действия над комплексными числами?</i>

	<p>8. Как записать комплексное число в тригонометрической форме и показательной формах?</p> <p>9. Дайте понятие модуля и аргумента комплексного числа.</p> <p>10. Как изображаются на плоскости комплексные числа?</p>
<p>Тема 2.1. Теория множеств</p>	<p>1. Что такое множество; элемент множества?</p> <p>2. Приведите примеры конечного и бесконечного множества.</p> <p>3. Что называется порядком множества?</p> <p>4. Какие операции выполняются над множествами?</p> <p>5. Дайте определение понятия «пересечения множеств». Приведите примеры.</p> <p>6. Дайте определение понятия «объединения множеств». Приведите примеры.</p> <p>7. Дайте определение понятия «разность множеств». Приведите примеры.</p> <p>8. Дайте определение понятия «дополнения одного множества до другого». Приведите примеры дополнений множеств.</p> <p>9. Приведите примеры отношений.</p> <p>10. Что называют графом?</p> <p>11. Что называют вершиной графа?</p> <p>12. Как определить степень вершины?</p> <p>13. Что называют ребром графа?</p>
<p>Тема 3.1 Дифференциальное и интегральное исчисление</p>	<p>1. Что называют пределом функции в точке?</p> <p>2. Что называют пределом функции на бесконечности?</p> <p>3. Сформулируйте свойства пределов.</p> <p>4. Какая функция называется бесконечно-малой?</p> <p>5. Какая функция называется бесконечно-большой?</p> <p>6. Дайте определение производной функции.</p> <p>7. Перечислите правила нахождения производной функции.</p> <p>8. Дайте определение сложной функции.</p> <p>9. В чем заключается геометрический смысл производной?</p> <p>10. В чем заключается механический смысл второй производной?</p> <p>11. Что называется первообразной?</p> <p>12. Перечислите свойства первообразной. 13. Что называется неопределенным интегралом?</p> <p>14. Какие свойства неопределенного интеграла вы</p>

	<p>знаете?</p> <p>15. Перечислите основные формулы интегрирования.</p> <p>16. Какие методы интегрирования вы знаете?</p> <p>17. В чем заключается суть формулы Ньютона-Лейбница?</p> <p>18. Дайте определение определенного интеграла.</p> <p>19. В чем заключается геометрический смысл определенного интеграла?</p>
<p>Тема 3.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения</p>	<p>1. Какое уравнение называется дифференциальным? Приведите примеры. 2. Какая функция называется решением дифференциального уравнения?</p> <p>3. Какое решение дифференциального уравнения называется общим и какое – частным?</p> <p>4. Что такое порядок дифференциального уравнения и как его определить?</p> <p>5. Сколько постоянных интегрирования имеет общее решение дифференциального уравнения первого порядка? Второго порядка? Третьего порядка?</p> <p>6. Как проверить, правильно ли найдено решение дифференциального уравнения или нет?</p> <p>7. Назовите известные вам типы дифференциальных уравнений.</p> <p>8. В чем заключается Задача Коши?</p> <p>9. Какой вид имеет простейшее дифференциальное уравнение второго порядка?</p> <p>10. Что такое характеристическое уравнение?</p> <p>11. Назовите виды общего решения линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.</p>
<p>Тема 3.4. Ряды</p>	<p>1. Дайте определение числового ряда</p> <p>2. Дайте определение гармонического ряда 3. Дайте определение знакпеременного ряда?</p> <p>4. Что называют частичной суммой ряда? 5. Какой ряд называется сходящимся?</p> <p>6. Сформулируйте признак сходимости числового ряда по Даламберу.</p> <p>7. Дайте определение степенного ряда.</p> <p>8. Что называют радиусом сходимости степенного ряда?</p>
<p>Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики</p>	<p>1. Что называется n – факториалом?</p> <p>2. Перечислите основные задачи комбинаторики.</p> <p>3. Что называется перестановками?</p> <p>4. Что называется размещениями?</p> <p>5. Что называется сочетаниями?</p>

	<p>6. Какие события называются достоверными? Приведите примеры.</p> <p>7. Какие события называются невозможными? Приведите примеры.</p> <p>8. Что называется вероятностью события? 9. Что называется относительной частотой события?</p> <p>10. Какие события называются несовместными? Приведите примеры.</p> <p>11. Чему равна сумма несовместных событий?</p> <p>12. Какие события называются противоположными?</p> <p>13. Сформулируйте теорему сложения вероятностей?</p> <p>14. Что называется условной вероятностью?</p> <p>15. Сформулируйте теорему умножения вероятностей?</p> <p>16. Какая величина называется случайной? 17. Какая случайная величина называется дискретной?</p> <p>18. Запишите формулу Бернулли.</p> <p>19. Что называется законом распределения случайной величины?</p> <p>20. Какой закон распределения называется биномиальным?</p> <p>21. Что называется математическим ожиданием дискретной случайной величины?</p> <p>22. Что называется дисперсией дискретной случайной величины?</p> <p>23. Что называется средним квадратическим отклонением дискретной случайной величины?</p>
<p>Тема 5.1 Численное интегрирование</p>	<p>1. Как оценить абсолютную погрешность вычислений?</p> <p>2. Как оценить относительную погрешность вычислений?</p> <p>3. В чем заключается суть метода прямоугольников?</p> <p>4. В чем заключается суть метода трапеций?</p> <p>5. В чем заключается суть метода Симпсона?</p> <p>6. Какой из приближенных методов является наиболее точным?</p>
<p>Тема 5.2. Численное дифференцирова ние</p>	<p>1. Как оценить абсолютную погрешность вычислений?</p> <p>2. Как оценить относительную погрешность вычислений?</p> <p>3. Запишите интерполяционную формулу Ньютона.</p>
<p>Тема 5.3. Численное решение обыкновенных</p>	<p>1. В чем заключается метод Эйлера?</p>

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС

1. Описание

Письменный опрос проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце изучения раздела/темы.

На проведение опроса отводится 30 минут.

5» «отлично» - в работе дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием научной терминологии.

«4» «хорошо» - в работе дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ логичен, изложен литературным языком с использованием научной терминологии.

«3» «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Оформление требует поправок, коррекции.

«2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Изложение неграмотно, допущены существенные ошибки. Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному выполнению учебных заданий.

3. Примерные задания

Тема 3.1. Дифференциальное и интегральное исчисление

Вариант 1

1. Сформулируйте определения: предела функции при стремлении аргумента к числу.
2. Дайте определения предела функции при стремлении аргумента к числу слева.
3. Какая функция называется бесконечно большой? Приведите пример.

4. Как раскрываются неопределенности вида $0/0$ и ∞/∞ , содержащие в числителе и знаменателе многочлены?
5. Запишите первый замечательный предел.

Вариант 2

1. Сформулируйте определения: предела функции при стремлении аргумента к бесконечности.
2. Дайте определения предела функции при стремлении аргумента к числу справа.
3. Какая функция называется бесконечно малой? Приведите пример. Каковы свойства бесконечно малых?
4. Как раскрываются неопределенности вида $0/0$, содержащие в числителе и знаменателе иррациональность
5. Запишите второй замечательный предел.

Тема 3.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения

Вариант 1

1. Сформулировать общие положения при составлении дифференциального уравнения по условию задачи.
2. Сформулировать задачу о радиоактивном распаде, записать для нее дифференциальное уравнение
3. Сформулировать задачу о падении тел в атмосферной среде, записать для нее дифференциальное уравнение.

Вариант 2

1. Записать дифференциальное уравнение показательного роста и показательного убывания и получить его решение. Привести примеры прикладных задач, решаемых с его помощью.
2. Сформулировать задачу о гармонических колебаниях, записать дифференциальное уравнение гармонических колебаний.
3. Сформулировать задачу о падении тел в атмосферной среде, записать для нее дифференциальное уравнение.

Тема 5.1. Численное интегрирование

Вариант №1

1. Описать суть приближенного вычисления определенного интеграла по формуле прямоугольников.
2. Описать суть приближенного вычисления определенного интеграла по формуле Симпсона.
3. Численное интегрирование дифференциальных уравнений методом Эйлера.

Вариант №2

1. Описать суть приближенного вычисления определенного интеграла по формуле прямоугольников.

2. Описать суть приближенного вычисления определенного интеграла по формуле трапеций.
3. Численное интегрирование дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты.

Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики

Вариант №1

1. Сформулируйте понятие случайного события.
2. Сформулируйте понятие достоверного события.
3. Какие события называются равносильными?
4. Что называется суммой событий?
5. Запишите формулу классического определения вероятности.
6. Чему равна вероятность суммы двух совместных событий?
7. Запишите формулу условной вероятности.
8. Сформулируйте понятие зависимых событий.
9. Чему равна вероятность произведения независимых событий.
10. Запишите формулу Байеса.

Вариант №2

1. Сформулируйте понятие вероятности.
2. Сформулируйте понятие невозможного события.
3. Какие события называются противоположными?
4. Что называется произведением событий.
5. Чему равна вероятность суммы двух несовместных событий?
6. Дайте понятие условной вероятности.
7. Сформулируйте понятие независимых событий.
8. Запишите формулировку теоремы умножения.
9. Запишите формулу полной вероятности.
10. Запишите формулу Бернулли

ТЕСТЫ

1. Описание

Тесты проводятся с целью контроля усвоенных умений, знаний и последующего анализа типичных ошибок (затруднений) обучающихся в конце изучения раздела/темы.

На выполнение теста отводится 45 минут.

2. Критерии оценки

Оценка	Количество верных ответов
«5» - отлично	Выполнено 91-100 % заданий
«4» - хорошо	Выполнено 76-90% заданий
«3» - удовлетворительно	Выполнено 61-75 % заданий
«2» - неудовлетворительно	Выполнено не более 60% заданий

3. Примерные тестовые задания

Тема 3.4. Ряды

1 вариант.

Задание 1. Четвертый член ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$ равен:

А. $-\frac{1}{5}$

Б. $-\frac{1}{9}$

В. $\frac{1}{7}$

Г. $-\frac{1}{7}$

Задание 2. Ряд $\cos x + \frac{\cos^2 x}{2} + \frac{\cos^3 x}{6} + \frac{\cos^4 x}{24} + \dots$ является...

А. Степенным

Б. Функциональным

В. Знакопередающим

Г. Знакоположительным

Задание 3. Дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10n+1}$. Используя необходимое условие сходимости

ряда, сделайте вывод

А. ряд расходится

Б. ряд сходится

В. нельзя определить сходится или расходится ряд

Г. другой ответ

Задание 4. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ исследовали на сходимость по признаку Коши, вычислили

предел $k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{3}$. Тогда можно сделать вывод, что ...

А. Данный ряд сходится

Б. Данный ряд расходится

В. Данный ряд может как сходиться так и расходиться.

Г. Данный ряд не существует

Задание 5. Найдите сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

1. 1
2. -1
3. 0,5
4. -0,5

Задание 6. Установите между рядом и его названием.

Название	Ряд
1. Ряд с положительными членами	А. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$
2. Знакопередающийся ряд	Б. $x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + \dots$
3. Степенной ряд	В. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots$
4. Функциональный ряд	Г. $\cos x + \cos^2 x + \cos^3 x + \cos^4 x + \dots$

Задание 7. Установите соответствие между числовым рядом и его общим членом a_n

Ряд	Общий член ряда a_n
1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \dots$	А. $a_n = \frac{1}{n+2}$
2. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$	Б. $a_n = \frac{1}{2n}$
3. $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots$	В. $a_n = \frac{1}{2n+1}$
4. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \dots$	Г. $a_n = \frac{1}{2n-1}$

2 вариант

Задание 1.

Четвертый член ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{3n+1}$ равен:

- А. 1
- Б. $-\frac{1}{13}$
- В. $\frac{1}{13}$
- Г. $\frac{1}{9}$

Задание 2.

Ряд $1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}x^3 + \dots$ является

- А. Знакопередающимся
- Б. Функциональным
- В. Степенным
- Г. Знакоположительным.

Задание 3.

Дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2n-1}$. Используя необходимое условие сходимости ряда сделайте

вывод

- А) ряд сходится
- Б) ряд расходится
- В) нельзя определить сходится или расходится ряд
- Г) другой ответ.

Задание 4.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n}$ исследовали на сходимость по признаку Даламбера, вычислили

предел $d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 5$. Тогда можно сделать вывод, что...

- А. Данный ряд сходится
- Б. Данный ряд расходится
- В. Данный ряд может как сходиться так и расходиться.
- Г. Данный ряд не существует

Задание 5.

Найдите сумму ряда: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$

- А. 1
- Б. 0,1
- В. 0,9
- Г. $\frac{1}{9}$

Задание 6.

Установите между рядом и его названием.

Название	Ряд
1. Ряд с положительными членами	А. $\sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \sin^4 x + \dots$
2. Знакопередающийся ряд	Б. $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$
3. Степенной ряд	В. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots$
4. Функциональный ряд	Г. $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots$

Задание 7.

Установите соответствие между числовым рядом и его общим членом a_n

Ряд	Общий член ряда a_n
1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \dots$	А. $a_n = \frac{1}{n+2}$
2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$	Б. $a_n = \frac{1}{2n}$
3. $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$	В. $a_n = \frac{1}{2^n}$
4. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \dots$	Г. $a_n = \frac{1}{n^2}$

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Описание

Самостоятельная работа по данному разделу/теме включает работу по самостоятельному изучению обучающимися ряда вопросов, выполнения домашних заданий, подготовку к лабораторно-практическим занятиям.

На самостоятельное изучение представленных ниже вопросов и выполнение заданий отводится 30 минут.

2. Критерии оценки самостоятельной работы

5» «отлично» - в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием научной терминологии.

«4» «хорошо» - в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки. Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с требованиями учебной программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках. Ответ логичен, изложен литературным языком с использованием научной терминологии.

«3» «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Оформление требует поправок, коррекции.

«2» «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Изложение неграмотно, возможны существенные ошибки. Отсутствует интерес, стремление к добросовестному и качественному выполнению учебных заданий.

Примерные задания для самостоятельной работы

Тема 1.1. Комплексные числа.

Вариант 1

1) Выполнить действия в алгебраической форме записи:

а) $\frac{3-2i}{1+3i}$; б) $(-2-i)(1+i)$;

2) Записать комплексные числа в тригонометрической форме и выполнить действия:

$$Z_1 = -\sqrt{3} - i; \quad Z_2 = 2 - 2i \quad \text{а) } \frac{Z_1}{Z_2}; \quad \text{б) } Z_2^2$$

3) Выполнить действия над комплексными числами в показательной форме:

$$Z_1 = -6 - 6i\sqrt{3}; \quad Z_2 = -1 - i \quad \text{а) } Z_1 \cdot Z_2; \quad \text{б) } Z_2^4$$

Вариант 2

1) Выполнить действия в алгебраической форме записи:

$$\text{а) } \frac{2+3i}{4+i}; \quad \text{б) } (3+2i)(2-i);$$

2) Записать комплексные числа в тригонометрической форме и выполнить действия:

$$Z_1 = 6i; \quad Z_2 = -2 + 2i\sqrt{3} \quad \text{а) } Z_1 \cdot Z_2 \quad \text{б) } Z_1^2$$

3) Выполнить действия над комплексными числами в показательной форме:

$$Z_1 = -4 - 4i; \quad Z_2 = -4 + 4i\sqrt{3}$$

$$\text{а) } \frac{Z_1}{Z_2}; \quad \text{б) } Z_2^3$$

Тема 3.1. Дифференциальное и интегральное исчисление

Вариант (соответствует номеру по списку)	Задания (вычислить производные функций)			
1.	$y = 2x^5 - \frac{4}{x^2}$	$y = \sqrt{4 - \sqrt{x}}$	$y = \lg(9 - x^2)$	$y = \cos 5x \cdot \cos 3x$
2.	$y = (2\sqrt{x} + 1)x^3$	$y = \frac{1}{3(2x-1)^3}$	$y = e^{3-2x}$	$y = \sin 5x \cdot \sin 3x - x$
3.	$y = 3x^4 + 2x^3$	$y = (2x - 3)^3$	$y = \frac{1}{2} \sin 2x$	$y = \cos x \cdot \sin 4x$
4.	$y = (3\sqrt{x} - 2)x^2$	$y = \sqrt{x^2 - 8x + 12}$	$y = (0,7)^x \cos 3x$	$y = \cos 4x \cdot \sin x + 1,5x$
5.	$y = \frac{x^2 - 3}{x + 2}$	$y = \sqrt{2x} - \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$	$y = 3^{\frac{x}{2}} - 5(0,7)^{4x}$	$y = \operatorname{ctg} \frac{x}{9} + \cos \frac{\pi}{9}$
6.	$y = 4x +$	$y = \sqrt{\frac{2}{2x^2 + 1}}$	$y = \cos^2 \frac{x}{4}$	$y = \operatorname{tg} \frac{x}{7} - \sin \frac{\pi}{7}$
7.	$y = \frac{x^2 + 5}{x - 2}$	$y = \sqrt{x^3 + \frac{243}{x}}$	$y = \cos 4x + \operatorname{ctg} x$	$y = \frac{1}{\cos^3 \frac{x}{3}}$
8.	$y = -\frac{1}{x} - 9x + \sqrt{25}$	$y = \frac{0,2}{(5-4x)^5}$	$y = 5^{-x^4} + 9(0,1)^x$	$y = \sqrt{\operatorname{ctg} x}$

9.	$y = 8x - x^2 - \frac{x^3}{3}$	$y = (x - 4)^4$	$y = \sqrt{\lg x}$	$y = \frac{1}{\arccos x}$
10.	$y = \frac{x}{x+2}$	$y = \frac{1}{(3-x)^2}$	$y = 2^{7-5x}$	$y = \frac{1}{\sin^4 \frac{x}{2}}$
11.	$y = -6x + x^2 + \frac{x^3}{6}$	$y = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$	$y = 5^{1-3x} + (0,6)^{\frac{x}{2}}$	$y = \sqrt{\lg x}$
12.	$y = \frac{x}{x-3}$	$y = \sqrt{2-x^5}$	$y = \sin^2 \frac{x}{4}$	$y = \arctg \frac{1}{x}$
13.	$y = -x + \frac{x^2}{4}$	$y = (x^2 + 3x - 4)^5$	$y = x^2 \cos \frac{x}{4}$	$y = \sin^2 x$
14.	$y =$	$y = \sqrt{16-x^2}$	$y = 3^{\frac{x}{4}} - 5(0,7)^{4x}$	$y = -x \cdot \cos 2x$
15.	$y = \frac{x^2}{2} + 2x$	$y = \frac{1}{(2x+7)^4}$	$y = \lg(2-\sqrt{x})$	$y = 7 \operatorname{ctg}(2x - 2\pi)$
16.	$y = 3 - \frac{4}{x}$	$y = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$	$y = 3^{\operatorname{tg} x}$	$y = \cos^2 x$
17.	$y = x\sqrt{x} - 8x^3$	$y = \sqrt{x + \frac{1}{x}}$	$y = 4 \sin \frac{x}{4}$	$y = \sin x \cdot \cos 5x$
18.	$y = \left(3 - \frac{4}{x^4}\right)(x^2 + 1)$	$y = (4x + 3)^6$	$y = x \sin \frac{x}{3}$	$y = 4 \operatorname{ctg}(2x + 3)$
19.	$y =$	$y = (x+1)\sqrt{x^2+1}$	$y = \frac{5^x}{x^3-2}$	$y = 2\pi - 0,5 \cdot \cos(\pi - x)$
20.	$y = \left(2 + \frac{3}{x^3}\right)(x-1)$	$y = \sqrt{x-1}(x+1)^2$	$y = \frac{1}{e^{2x}}$	$y = 2x^2 - 30 \cos(5x + 6)$
21.	$y = \frac{x^2+3x}{x+4}$	$y = \sqrt{-x^2-10x}$	$y = \frac{1}{\lg(3-x)+1}$	$y = 3 \sin^2(2x-1)$
22.	$y = \frac{x^2-3x}{x-4}$	$y = (3x-2)^5$	$y = e^{x^2}$	$y = \arcsin \sqrt{1+x^2}$
23.	$y = \frac{1}{x} + 2x$	$y = x^2 \sqrt{4x-3}$	$y = e^{2x} \sin x$	$y = 3 \cos(2,3x - 10\pi)$
24.	$y = x - \frac{1}{x}$	$y = \sqrt{5-4x-x^2}$	$y = 8 \cos \frac{x}{8}$	$y = \arctg \frac{1+x}{1-x}$
25.	$y = \frac{6}{x-4}$	$y = 2\sqrt{1+3x-x^2}$	$y = e^{\frac{x}{4}}$	$y = \arctg \sqrt{x^2+2x}$
26.	$y = (2x-3)(3x+1)$	$y = \sqrt{6x} + 2$	$y = 5^{1-3x} + (0,6)^{\frac{x}{5}}$	$y = \arccos(1-2x)$
27.	$y = \frac{2x-3}{1-3x}$	$y = (x^2-6x+5)^2$	$y = 2^{\frac{x}{4}} - \sin 3x$	$y = -\arctg \sqrt{4x-1}$
28.	$y = \frac{t^2}{1+6t}$	$y = 5(3x^5 - 6x^3 - 3)^5$	$y = \sin 3x$	$y = \arcsin 3ax$
29.	$y = \frac{ax+b}{cx+d}$	$y = \sqrt{1-x^3}$	$y = \frac{1}{e^{2x}}$	$y = \arcsin \frac{x}{b}$
30.	$y = \frac{(3x+2)(2x-3)}{7}$	$y = (x^2-6x-3)^5$	$y = e^{\cos 5x}$	$y = \sin(-x) + \sin x$

Тема 3.1. Дифференциальное и интегральное исчисление

I вариант	II вариант	III вариант
«3»		
a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{5x+2}{2x+3}$	a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-8}{4x+2}$	a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{4x+2}{5x-1}$
б) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-2x}{x+1}$	б) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+5}{2x+7}$	б) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-8x}{4x+5}$

$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 36}{x - 6}$	$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25}$	$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$
$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$	$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 3x}$	$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 5x}$
«4»		
$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 2x - 3}{x^2 + 3x + 3}$	$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x + 5}{x^2 + 6}$	$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^3 + 5x - 2}$
$\text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 2x^2 + 3x + 1}{4x^3 - x^2 - 7x + 8}$	$\text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 3x - 2}{x^4 - 2x^3 + 3x - 1}$	$\text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^5 - 2x^4 + 3x - 1}{x^3 + 2x^2 + 4x - 2}$
$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 4}$	$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9}$	$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{5x^2 - 4x - 1}$
$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 4x}{\sin 3x}$	$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x}$	$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{\sin 3x}$
«5»		
$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$	$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$	$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$
$\text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^3 - 3x^2 + 2x}{4x^3 - 2x + 1}$	$\text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 4x + 5}{x^3 + 4}$	$\text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x - 3}{300x - 1000}$
$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{4 + x + x^2} - 2}{x + 1}$	$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{1 + x + x^2} - \sqrt{7 + 2x - x^2}}{x^2 - 2x}$	$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x + x^2} - \sqrt{1 - x + x^2}}{x^2 - x}$
$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{x^2}$	$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{\sin \frac{2x}{5}}$	$\text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 4x}{\sin^2 x}$

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

1. Описание

Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений, знаний и последующего анализа типичных ошибок (затруднений) обучающихся в конце изучения раздела/ темы.

Письменная контрольная работа включает 2 варианта заданий. Задания дифференцируются по уровню сложности. Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания.

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.

2. Критерии оценки контрольной работы

5» «отлично» - глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка предполагает грамотное и логичное изложение ответа, обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений.

«4» «хорошо» - обучающийся полно усвоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.



«3» «удовлетворительно» - обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновывать собственные суждения.

«2» «неудовлетворительно» - обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания по разделу/ теме, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

1. Примерные варианты заданий

Тема 2.1. Теория множеств

В-1	В-2
<p>Задание 1 (базовый уровень): Пусть $A [-5;0)$, $B (-2;4)$ – интервальные промежутки целых чисел; $C = \{x x^2 + 3x - 4 = 0\}$ – множество решений квадратного уравнения. Запишите с помощью перечисления элементов множеств, следующие операции: а) $A \cap B =$ б) $B \cap C =$ в) $A / C =$ г) $C \Delta A =$ д) $B \cap A \cup C =$</p> <p>Задание 2 (повышенный уровень): Выразите через базовые множества и операции над ними закрашенную область: задача 1: задача 2:</p>	<p>Задание 1 (базовый уровень): Пусть $A (-5;0)$, $B [2;6)$ – интервальные промежутки целых чисел; $C = \{x x^2 + 3x + 2 = 0\}$ – множество решений квадратного уравнения. Запишите с помощью перечисления элементов множеств, следующие операции: а) $A \cap C =$ б) $B \cap A =$ в) $A / B =$ г) $C \Delta A =$ д) $B \cap A \cup C =$</p> <p>Задание 2 (повышенный уровень): Выразите через базовые множества и операции над ними закрашенную область: задача 1: задача 2:</p>





Задание 3 (высокий уровень):

В таблице приведены операции над множествами и количество элементов, которые образовались в областях этих операций:

Операции (запросы)	Кол-во элементов
Жираф	70
Слон	112
Моська	16
Слон \cap Моська	5
Жираф \cap Моська	0
Жираф \cup Моська \cup Слон	164

Какое количество элементов области **Слон \cap Жираф**?



Задание 3 (высокий уровень):

В таблице приведены операции над множествами и количество элементов, которые образовались в областях этих операций:

Операции (запросы)	Кол-во элементов
Масло	164
Сыр	44
Холст	150
Холст \cap Масло	108
Сыр \cup Холст	194
Холст \cup Сыр \cup Масло	238

Какое количество элементов области **Сыр \cap Масло**?

Ответы (вариант 1)

Задание 1.

A(-5, -4, -3, -2, -1)

B(-1, 0, 1, 2, 3)

C(-4, 1)

Решение:

а) -1

б) 1

в) -5, -3, -2, -1

г) -5, -3, -2, -1, 1

д) -1, -4, 1

Ответы (вариант 2)

Задание 1.

A(-4, -3, -2, -1)

B(2, 3, 4, 5)

C(-2, -1)

Решение:

а) -2, -1

б) пустое множество

в) -4, -3, -2, -1

г) -4, -3

д) -2, -1

<p>Задание 2. Формула 1: $A/(B \cap C)$ Формула 2: $(A \cap B) \cup (C/(A \cup B))$</p> <p>Задание 3. Ответ: $\text{Слон} \cap \text{Жираф} = 29$</p>	<p>Задание 2. Формула: $A \cap B \cup B \cap C$ Формула 2: $C/(A \Delta B)$</p> <p>Задание 3. Ответ: $\text{Сыр} \cap \text{Масло} = 12$</p>
---	--

Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики

Вариант 1

1. При бросании игральной кости вычислить вероятность события «Выпало 2 очка».
2. В мешочке имеется 5 одинаковых кубиков. На всех гранях каждого кубка написана одна из следующих букв: о, п, р, с, т. Найти вероятность того, что на вытянутых по одному и расположенных «в одну линию» кубиков можно будет прочесть слово «спорт».
3. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу отобраны семь человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся три женщины.
4. По цели произведено 20 выстрелов, причем зарегистрировано 18 попаданий. Найти относительную частоту попаданий в цель.
5. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что все извлеченные детали окажутся окрашены.

Вариант 2

1. При бросании монеты вычислить вероятность выпадения «решки».
2. Пять различных книг расставлены наудачу на одной полке. Найти вероятность того, что две определенные книги окажутся рядом.
3. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 9 студентов, найти вероятность того, что среди отобранных студентов 5 отличников.
4. При испытании партии приборов относительная частота годных приборов оказалась равной 0,9. Найти число годных приборов, если всего было проверено 200 приборов.
5. В конверте среди 100 фотокарточек находится одна разыскиваемая. Из конверта наудачу извлекают 10 карточек. Найти вероятность того, что среди них окажется нужная.

Тема 3.4. Ряды

Вариант 1.

1. Написать первые пять членов ряда по заданному общему члену:

а) $a_n = \frac{1}{4n^2 + 1}$

б) $a_n = \frac{2^n}{n!}$

2. Найти формулу общего члена ряда: $2+4+8+16+\dots$

3. Установить расходимость ряда с помощью следствия из необходимого признака $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+4}$

4. Используя признак Даламбера, исследовать на сходимость ряд: а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2n}$

5. Найти область сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$

Вариант 2.

1. Написать первые пять членов ряда по заданному общему члену:

а) $a_n = \frac{2n+1}{n^2}$

б) $a_n = \frac{n}{(n+1) \cdot 2^n}$

2. Найти формулу общего члена ряда: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} +$

3. Установить расходимость ряда с помощью следствия из необходимого признака $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{2n+1}$

4. Используя признак Даламбера, исследовать на сходимость ряд: а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 2^n}$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$

5. Найти область сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$

Тема 5.1. Численное интегрирование

Вариант 1

1. Приближенное значение интеграла $\int_6^{11} (\bar{\sigma} - 5) dx$, вычисленное по формуле прямоугольников

$\int_a^b f(x) dx \approx h(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}))$, где $h = \frac{b-a}{n}$, $n=5$, $x_i = a + ih$, $i=0, 1, \dots, n-1$, равно...

2. По таблице значений функции

x	0	1	2
y	4	6	9

Составлена таблица конечных разностей:

X	Y	Δy	$\Delta^2 y$
0	4		
		2	
1	6		1
		3	
2	9		

Тогда приближенное значение производной функции

$$f'(x) = \frac{1}{h} \left(\Delta y_0 + \frac{2t-1}{2} \Delta^2 y_0 + \dots \right), \text{ где } t = \frac{x-x_0}{h}, \text{ в точке } x=0,5 \text{ равно } \dots$$

Вариант 2

1. Приближенное значение интеграла $\int_1^5 (12-x) dx$, вычисленное по формуле прямоугольников

$$\int_a^b f(x) dx \approx h(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1})) \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad n=4, \quad x_i = a + ih,$$

$i=0,1,\dots,n-1$, равно...

2. По таблице значений функции

x	1	2	3
y	0	3	7

Составлена таблица конечных разностей:

X	Y	Δy	$\Delta^2 y$
1	0		
		3	
2	3		1
		4	
3	7		

Тогда приближенное значение производной функции

$$f'(x) = \frac{1}{h} \left(\Delta y_0 + \frac{2t-1}{2} \Delta^2 y_0 + \dots \right), \text{ где } t = \frac{x-x_0}{h}, \text{ в точке } x=1,5$$

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

1. Описание

В ходе практического занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины, учатся использовать формулы, применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

Содержание, этапы проведения практического занятия представлены в обязательном приложении **Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине**

При оценивании практического занятия учитываются следующие критерии:

- качество выполнения работы;
- качество оформления отчета по работе;
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

На проведение практического занятия отводится 90 (180) минут.

2. Критерии оценки практического занятия

5» «отлично» - самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на нормативно-правовую базу.

«4» «хорошо» - самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.

«3» «удовлетворительно» - в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия.

«2» «неудовлетворительно» - не решил учебно-профессиональную задачу или задание.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Предметом оценки являются сформированные умения и знания, а также динамика освоения общих и профессиональных компетенций. Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает Форму промежуточной аттестации- экзамен

ЭКЗАМЕН

1. Условия аттестации: аттестация проводится в форме экзамена по завершению освоения учебного материала дисциплины и положительных результатах текущего контроля успеваемости.

2. Время аттестации: на проведение аттестации отводится 3 астрономического часа, на подготовку – 20 минут

3. План варианта (соотношение практических задач/вопросов с содержанием учебного материала в контексте характера действий аттестуемых).

4. Общие условия оценивания

Оценка по промежуточной аттестации носит *комплексный характер и может включать в себя:*

- результаты выполнения аттестационных заданий;
- оценку портфолио;
- оценку прочих достижений обучающегося.

5. Критерии оценки.

Перечень вопросов и заданий для проведения экзамена

1. Числовые множества.
2. Структура действительных чисел и их геометрическая интерпретация.
3. Мнимая единица. Мнимые числа. Множество комплексных чисел.
4. Формы записи комплексных чисел.
5. Степени мнимой единицы. Примеры.
6. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
7. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Геометрическая сумма и разность комплексных чисел.
8. Модуль и аргумент комплексного числа.

9. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
10. Показательная форма записи комплексного числа. Действия над комплексными числами в показательной форме.
11. Множество. Элементы множества. Виды множеств.
12. Операции над множествами. Примеры.
13. Диаграммы Эйлера-Венна.
14. Отношения. Их виды и свойства.
15. Основные понятия теории графов. Построение графов.
16. Понятие предела функции в точке.
17. Понятие предела функции на бесконечности.
18. Теоремы о пределах. Правила вычисления.
19. Приращение аргумента и приращение функции. Производная функции.
20. Правила дифференцирования. Производная сложной функции. Примеры.
21. Таблица производных простейших функций.
22. Физический смысл производной.
23. Геометрический смысл производной.
24. Вторая производная и ее физический смысл.
25. Нахождение экстремумов функции при помощи производной.
26. Первообразная. Основное свойство первообразной.
27. Неопределенный интеграл. Основные свойства интеграла.
28. Таблица неопределенных интегралов. Методы интегрирования. Примеры.
29. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Методы интегрирования.
30. Геометрический смысл определенного интеграла.
31. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения.
32. Физические приложения определенного интеграла.
33. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Порядок дифференциального уравнения. Задача Коши. Интегральные кривые.
34. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Алгоритм решения.
35. Дифференциальные уравнения второго порядка. Способы решения. Задача Коши.
36. Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Способы решения.
37. Числовые ряды. Сходимость рядов.
38. Признаки сходимости рядов. Признак Даламбера.
39. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости.
40. Степенные ряды. Признаки сходимости.
41. Комбинаторика. Основные понятия комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения.
42. Предмет теории вероятностей. События. Виды событий.

43. Случайные события и их виды.
 44. Частота и вероятность события.
 45. Дискретная случайная величина. Закон распределения дискретной случайной величины.
 46. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины.

7. Варианты заданий для проведения экзамена

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 «Петербургский государственный университет путей сообщения
 Императора Александра I»
 (ФГБОУ ВО ПГУПС)
 Калужский филиал ПГУПС

<p>Рассмотрено цикловой комиссией математических и естественнонаучных дисциплин</p> <hr/> <p>Председатель Е.В. Серегина « » _____ 2019г.</p>	<p>ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 по дисциплине «Прикладная математика» для специальности 08.02.10 2 курс</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР</p> <hr/> <p>А.В. Полевой « » _____ 2019г.</p>
---	--	---

1. Числовые множества. Структура действительных чисел.
2. Вычислить интеграл $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sin x dx$.
3. Представить комплексное число в тригонометрической форме: $Z_1 = \frac{\sqrt{3}}{5} - \frac{1}{5}i$.
4. Скорость прямолинейно движущегося тела $v = (4t - t^2)$ м/с. Вычислить путь, пройденный телом за первые 5 сек.

Преподаватель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«Петербургский государственный университет путей сообщения
 Императора Александра I»
 (ФГБОУ ВО ПГУПС)
 Калужский филиал ПГУПС**

Рассмотрено цикловой комиссией математических и естественнонаучных дисциплин <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Председатель Е.В. Серегина « » _____ 2019г.	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 по дисциплине «Прикладная математика» для специальности 08.02.10 2 курс	УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> А.В. Полевой « » _____ 2019г.
--	---	--

1. Множество комплексных чисел. Структура. Формы записи комплексных чисел.
2. Найдите ускорение точки, движущейся прямолинейно по закону $s(t) = 2t^2 - t^3$ в момент времени $t = 1$.
3. На пять сотрудников выделены три путевки. Сколькими способами их можно распределить, если все путевки различны.
4. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой $y = x^2 + 4x - 3$ и осью Ox .

Преподаватель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«Петербургский государственный университет путей сообщения
 Императора Александра I»
 (ФГБОУ ВО ПГУПС)
 Калужский филиал ПГУПС**

Рассмотрено цикловой комиссией математических и естественнонаучных дисциплин <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> Председатель Е.В. Серегина « » _____ 2019г.	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 по дисциплине «Прикладная математика» для специальности 08.02.10 2 курс	УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> А.В. Полевой « » _____ 2019г.
--	---	--

1. Мнимая единица. Степени мнимой единицы.
2. Бросают игральную кость. Чему будет равна вероятность события A - «выпало число очков, кратное 3»?
3. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 2x^2 + 1$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$.
4. Найдите декартово произведение множеств A и B , если $A = \{m; n\}$, $B = \{a; b; c\}$.

Преподаватель

9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и подготовки обучающихся к экзамену:

Основная:

1. Богомолов, Н. В. Математика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко.— М. : Юрайт, 2017. — 396 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru

2. Баврин, И. И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. И задачник для СПО / И. И. Баврин. — М.: Юрайт, 2017. — 209 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru

3. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера.— М. : Юрайт, 2018. — 346 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru

4. Дорофеева, А. В. Математика [Электронный ресурс]: учеб. для СПО. — М. : Юрайт, 2017. — 400 с. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru>.

5. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО— М. : Юрайт, 2017. — 329 с. - Режим доступа : [//biblio-online.ru](http://biblio-online.ru).

Дополнительная:

1. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов— М.: Юрайт, 2017. — 364 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru

2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Ч.2 [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — М.: Юрайт, 2017. — 285 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru

3. Канцедаль, С.А. Дискретная математика [Текст]: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2015.- 224с. - (Проф. образование).

4. Башмаков, М. И. Математика [Текст]: учеб. / М. И. Башмаков. - М.: КНОРУС, 2017. - 394 с. - (Среднее профессиональное образование).

5. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике в 2 ч. [Текст]: учеб. пособие для СПО / Н. В. Богомолов. – М.: Юрайт, 2017.

6. Омельченко, В.П. Математика [Текст]: учеб. пособие / В.П. Математика, Э.В. Курбатова. - Ростов н /Д.: Феникс, 2014. - 380с.

Приложение 1.

Методические указания по проведению практических (лабораторных) занятий по дисциплине

Пояснительная записка

Методические указания для студентов по выполнению практических работ по учебной дисциплине Прикладная математика для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»

Содержание и объем практических работ соответствует требованиям ФГОС СПО.

Практические занятия по дисциплине Прикладная математика проводятся с целью закрепления теоретического материала и приобретения практических навыков после изучения теоретической части соответствующих тем.

Данное пособие содержит 8 практических работ, которые за время обучения должны выполнить обучающиеся под руководством преподавателя.

В результате выполнения практических работ обучающиеся должны:

уметь:

- использовать методы линейной алгебры;
- решать основные прикладные задачи численными методами; знать:
- основные понятия и методы основ линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей;
- основные численные методы решения прикладных задач.

Методические указания по выполнению практических работ рассчитаны на 24 часа и содержат 8 практических работ, перечисленных в рабочей программе по дисциплине Прикладная математика

В начале каждой работы, помещены основные определения, теоремы, формулы и другие краткие сведения по теории, и методические указания, необходимые для решения последующих задач. Затем приводятся подробные решения типовых задач и примеров с краткими пояснениями теоретических положений; в конце каждой практической работы содержатся задания для самостоятельного решения, контрольные вопросы.

Каждый студент оформляет практическую работу, которая оценивается преподавателем.

Требования к выполнению практических работ:

- работа должна быть оформлена в файловую папку; каждая работа выполняется на листах формата А4;

- на титульном листе указывается: учебное заведение, вид работы, наименование дисциплины, ФИО студента, № группы, ФИО преподавателя;

- при выполнении указывается № практического занятия, тема, цель; условия заданий переписываются полностью;

- каждое задание сопровождается формулами, оформленными записями и расчетами; - в конце каждого задания необходимо записать ответ.

При выполнении практических работ обучающиеся приобретают навыки и умения самостоятельной работы с учебной, справочной и технической литературой, что пригодится им в дальнейшей профессиональной деятельности.

Практическое занятие 1(4ч)

Комплексные числа и действия над ними. Решение задач для нахождения полного сопротивления электрической цепи переменного тока с помощью комплексных чисел.

Цель: закрепить практические навыки решения задач с применением теории комплексных чисел; сформировать умения находить полное сопротивление электрической цепи переменного тока с помощью комплексных чисел.

Краткие теоретические сведения

Нахождение полного сопротивления электрической цепи переменного тока с помощью комплексных чисел

Расчет линейных электрических схем переменного тока аналогичен расчету электрических схем постоянного тока. В обоих случаях составляют систему алгебраических уравнений по методам, основанным на законах Ома и Кирхгофа.

Для схем постоянного тока уравнения составляют по действительным значениям напряжений, токов, сопротивлений и проводимостей. В схемах же переменного тока для уравнений применяют комплексные величины: U , I , $Z=R+jX$. При этом все параметры записывают в виде комплексных чисел в алгебраической показательной или тригонометрической форме. При переходе от интегрально-дифференциальных уравнений дифференцирование мгновенного значения заменяют умножением $j\omega$ на соответствующую комплексную величину, а интегрирование — делением комплексной величины на $j\omega$:

$$\frac{di}{dt} \rightarrow j\omega I, \quad \int idt \rightarrow \frac{I}{j\omega}$$

если $i = I_m \cos(\omega t + \varphi)$.

Полученную систему алгебраических уравнений решают относительно неизвестного комплексного параметра, например, тока $I=I_m e^{j\varphi}$. При необходимости совершают переход от комплексной величины к ее мгновенному значению.

Алгоритм расчета комплексным методом

1. Мгновенные значения напряжений источников ЭДС, токов источников тока заменяют соответствующими комплексными значениями, например, $u = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ заменяют $U = U_m e^{j\varphi}$, $i = I_m \cos(\omega t + \varphi)$ заменяют $I = I_m e^{j\varphi}$.

2. Комплексные сопротивления $Z = R + jX$ всех ветвей схемы записывают в зависимости от выбранного метода расчета.

3. Алгебраические уравнения решают относительно искомой комплексной величины, например, тока $I = I_m e^{j\varphi}$.

4. При необходимости переходят к мгновенному значению

$$i = I_m \cos(\omega t + \varphi).$$

В любой момент времени сумма мгновенных значений напряжений на последовательно включенных элементах цепи равна мгновенному значению приложенного напряжения (Рис. 1):




Рис. 1.

$$u = u_R + u_L + u_C.$$

Во всех последовательно включенных элементах цепи изменения силы тока происходят практически одновременно, так как электромагнитные взаимодействия распространяются со скоростью света. Поэтому можно считать, что колебания силы тока во всех элементах последовательной цепи происходят по закону:

$$i = I_m e^{j\omega t}$$

Колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока

$$u_R = i \cdot R = I_m \cdot R \cdot e^{j\omega t},$$

а колебания напряжения на катушке опережают по фазе колебания силы тока на $\pi/2$.

$$u_L = L \frac{di}{dt} = j\omega \cdot L \cdot e^{j\omega t} = Z_L \cdot I_m e^{j\omega t},$$

где

$$Z_L = j\omega \cdot L \cdot ,$$

колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе на $\pi/2$ от колебаний силы тока

$$u_c = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int_0^t i \cdot dt = \frac{I_m}{j\omega C} e^{j\omega t} = \frac{I_m j}{j^2 \omega C} e^{j\omega t} = -\frac{j}{\omega C} I_m e^{j\omega t} ,$$

где

$$Z_C = -\frac{j}{\omega \cdot C} I_m e^{j\omega t} , \text{ (емкостное сопротивление)}$$

Поэтому уравнение можно записать так:

$$u = I_m R \cdot e^{j\omega t} + j\omega L \cdot I_m \cdot e^{j\omega t} - \frac{j}{\omega C} \cdot I_m \cdot e^{j\omega t} = \left(R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} \right) \cdot I_m \cdot e^{j\omega t}$$

согласно закону Ома:

$$Z = R + j(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}) \text{ – комплексное сопротивление.}$$

Таким образом, действительное число – это *активное* сопротивление, а мнимое число – *реактивное*. Общее комплексное сопротивление можно найти сложением комплексных чисел, что значительно проще метода векторных диаграмм особенно для разветвленных цепей.

Задача № 1. Необходимо получить формулу, описывающую комплексное сопротивление Z двухполюсника с двумя резисторами и двумя конденсаторами.




Схема цепи к задаче № 1

Решение:

Искомая величина Z является суммой сопротивлений Z_1 и Z_2 двух более простых цепей, одна из которых образована последовательным, а другая параллельным включением элементов:

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{j\omega C_1},$$

$$Z_2 = \frac{R_2 / (j\omega C_2)}{R_2 + 1 / (j\omega C_2)}.$$

Приводя к общему знаменателю, получаем

$$Z(j\omega) = Z_1 + Z_2 = \frac{1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + j\omega(R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1)}{j\omega C_1(1 + j\omega R_2 C_2)}.$$

Задания для самостоятельного решения

Задание 1.

Определите комплексное сопротивление двухполюсника (см. рис.2), если известны R_1 ; R_2 ; L ; C .




Схема цепи

Задание 2.

Выполните сложение $z_1 + z_2$, вычитание $z_1 - z_2$, умножение $z_1 \cdot z_2$ и деление $\frac{z_1}{z_2}$

двух комплексных чисел:

1.	$z_1 = -2 + 4i, z_2 = 1 - 8i;$	16.	$z_1 = -4i, z_2 = 3 - 3i;$
----	--------------------------------	-----	----------------------------

2.	$z_1 = 2 - 3i, z_2 = 4 + i;$	17.	$z_1 = 5 - 4i, z_2 = i + 1;$
3.	$z_1 = 5 - 3i, z_2 = 2i;$	18.	$z_1 = -3i + 1, z_2 = 4 + i;$
4.	$z_1 = -1 + 6i, z_2 = 6 - i;$	19.	$z_1 = 7 - 2i, z_2 = 1 + 2i;$
5.	$z_1 = -1 + 2i, z_2 = 3 - i;$	20.	$z_1 = 6 - 2i, z_2 = 5i;$
6.	$z_1 = 1 + 3i, z_2 = 2 - 5i;$	21.	$z_1 = -7 + 3i, z_2 = 3 - i;$
7.	$z_1 = 7 + i, z_2 = 7 - i;$	22.	$z_1 = 10 - 3i, z_2 = 2 + i;$
8.	$z_1 = -2 + 6i, z_2 = i;$	23.	$z_1 = 4 - 8i, z_2 = 1 + i;$
9.	$z_1 = i - 2, z_2 = 3 + 4i;$	24.	$z_1 = -2i - 6, z_2 = 1 - 2i;$
10.	$z_1 = 2 + 9i, z_2 = 4 - 5i;$	25.	$z_1 = -6 + i, z_2 = 4 - 2i;$
11.	$z_1 = 10 - i, z_2 = 10 + i;$	26.	$z_1 = 3 - 4i, z_2 = 3 + 4i;$
12.	$z_1 = 2 + 2i, z_2 = 3 + 3i;$	27.	$z_1 = -3 - 2i, z_2 = 5 - i;$
13.	$z_1 = -1 - 2i, z_2 = 3i;$	28.	$z_1 = 11 - 3i, z_2 = 1 - i;$
14.	$z_1 = 2i, z_2 = 1 - 4i;$	29.	$z_1 = -2 + 5i, z_2 = 2i;$
15.	$z_1 = 15 - i, z_2 = 1 - 4i;$	30.	$z_1 = 7 + 5i, z_2 = 4 - 3i;$

Пример оформления задания 2:

$$z_1 = -1 + 5i, \quad z_2 = 1 - i;$$

Решение:

1. Сложение:

$$z_1 + z_2 = -1 + 5i + 1 - i = 0 + 4i = 4i;$$

2. Вычитание:

$$z_1 - z_2 = -1 + 5i - (1 - i) = -1 + 5i - 1 + i = -2 + 6i;$$

3. Умножение:

$$z_1 \cdot z_2 = (-1 + 5i) \cdot (1 - i) = -1 + i + 5i - 5i^2 = -1 + i + 5i - 5 \cdot (-1) = -1 + i + 5i + 5 = 4 + 6i;$$

4. Деление:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{-1 + 5i}{1 - i} = \frac{(-1 + 5i) \cdot (1 + i)}{(1 - i) \cdot (1 + i)} = \frac{-1 - i + 5i + 5i^2}{1 - i^2} = \frac{-1 - i + 5i - 5}{1 + 1} = \frac{-6 + 4i}{2} = -3 + 2i.$$

Задание 3.

Запишите комплексное число в тригонометрической и показательной формах:

1.	$z = 3 + 3i$	16.	$z = -1 + i$
2.	$z = -6i$	17.	$z = -1 + \sqrt{3}i$
3.	$z = -3 - 3i$	18.	$z = 2i$
4.	$z = 1 - \sqrt{3}i$	19.	$z = \sqrt{3} - i$
5.	$z = -9i$	20.	$z = 4 - 4i$
6.	$z = -10 + 10i$	21.	$z = 3 - 3i$
7.	$z = -3 + 3i$	22.	$z = -i$
8.	$z = 8 - 8i$	23.	$z = -2i$
9.	$z = -1 - i$	24.	$z = 4 + 4i$
10.	$z = -2 - 2i$	25.	$z = 5i$

11.	$z = 16i$	26.	$z = 7 + 7i$
12.	$z = -8i$	27.	$z = -4 - 4i$
13.	$z = 17i$	28.	$z = 5 + 5i$
14.	$z = -1 - \sqrt{3}i$	29.	$z = -15i$
15.	$z = -10i$	30.	$z = -\sqrt{3} - i$

Пример оформления задания 3:

$$z = 11 + 11i$$

Решение:

1. Определяем действительную и мнимую части комплексного числа:

$$a = 11, b = 11.$$

2. Находим модуль комплексного числа $r = \sqrt{a^2 + b^2}$:

$$r = \sqrt{11^2 + 11^2} = \sqrt{121 + 121} = \sqrt{2 \cdot 121} = 11\sqrt{2}.$$

3. Находим аргумент комплексного числа:

$$\cos \varphi = \frac{a}{r} = \frac{11}{11\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\sin \varphi = \frac{b}{r} = \frac{11}{11\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

Следовательно, $\varphi = \frac{\pi}{4}$ радиан.

4. Получаем тригонометрическую форму комплексного числа

$$z = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi) = 11\sqrt{2} \cdot \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \cdot \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

5. Получаем показательную форму комплексного числа:

$$z = r \cdot e^{i\varphi} = 11\sqrt{2} \cdot e^{i \frac{\pi}{4}}.$$

Задание 4.

Решите уравнение:

1.	$3x^2 + 75 = 0$	16.	$2x^2 + 8 = 0$
2.	$x^2 + 4x + 6 = 0$	17.	$x^2 + x + 12,5 = 0$
3.	$x^2 + 6x + 14 = 0$	18.	$x^2 + 2x + 10 = 0$
4.	$2x^2 - 6x + 5 = 0$	19.	$x^2 - 2x + 2 = 0$
5.	$2x^2 + 4x + 7 = 0$	20.	$x^2 - x + 1 = 0$
6.	$x^2 + 6x + 25 = 0$	21.	$x^2 + 3x + 6,25 = 0$
7.	$4x^2 + 64 = 0$	22.	$x^2 + 2x + 3 = 0$
8.	$x^2 + 3x + 3 = 0$	23.	$x^2 + 5x + 7 = 0$
9.	$x^2 - 5x + 2 = 0$	24.	$3x^2 + 243 = 0$
10.	$x^2 + x + 1 = 0$	25.	$x^2 + 4x + 5 = 0$
11.	$2x^2 + 2x + 1 = 0$	26.	$x^2 + 6x + 10 = 0$
12.	$x^2 - 2x + 5 = 0$	27.	$-5x^2 - 125 = 0$

13.	$x^2 + 2x + 2 = 0$	28.	$2x^2 - x + 5 = 0$
14.	$6x^2 - 2x + 1 = 0$	29.	$3x^2 - x + 2 = 0$
15.	$2x^2 - 2x + 1 = 0$	30.	$5x^2 + 7x + 3 = 0$

Пример оформления задания 4:

$$x^2 - 6x + 25 = 0$$

Решение:

$$a = 1, b = -6, c = 25.$$

$$D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 36 - 100 = -64 = 64 \cdot (-1) = 64 \cdot i^2$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{6 - \sqrt{64 \cdot i^2}}{2} = \frac{6 - 8i}{2} = 3 - 4i;$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{6 + \sqrt{64 \cdot i^2}}{2} = \frac{6 + 8i}{2} = 3 + 4i.$$

Ответ: $3 \pm 4i$.

Практическое занятие 2 (4ч)

Построение графа по условию ситуационных задач: в управлении инфраструктурами на транспорте; в структуре взаимодействия различных видов транспорта.

Цель: приобретение практических умений и навыков решения ситуационных задач с использованием основные понятия теории графов.

Задача №1. Между девятью планетами солнечной системы установлено космическое сообщение. Рейсовые ракеты летают по следующим маршрутам: Земля – Меркурий; Плутон – Венера; Земля – Плутон; Плутон – Меркурий; Меркурий – Венера; Уран – Нептун; Нептун – Сатурн; Сатурн – Юпитер; Юпитер – Марс и Марс – Уран. Можно ли долететь на рейсовых ракетах с Земли до Марса?

Решение: Нарисуем схему условия: планеты изобразим точками, а маршруты ракет – линиями.




Рис. 1.

Теперь сразу видно, что долететь с Земли до Марса нельзя.

Задача № 2. Доска имеет форму двойного креста, который получается, если из квадрата 4x4 убрать угловые клетки.




Рис. 2.

Можно ли обойти ее ходом шахматного коня и вернуться на исходную клетку, побывав на всех клетках ровно по одному разу?

Решение: Занумеруем последовательно клетки доски:




Рис. 3.

А теперь с помощью рисунка покажем, что такой обход таблицы, как указано в условии, возможен:




Рис. 4.

Мы рассмотрели две непохожие задачи. Однако решения этих двух задач объединяет общая идея – представление решения с помощью графа. Заметим, что не каждая картинка такого вида будет называться графом. Например, если вас попросят нарисовать в тетради пятиугольник, то такой рисунок графом не будет.

Задача №3. В городе Маленьком 15 телефонов. Можно ли их соединить проводами так, чтобы каждый телефон был соединен ровно с пятью другими?

Решение: Допустим, что такое соединение телефонов возможно. Тогда представим себе граф, в котором вершины обозначают телефоны, а ребра – провода, их соединяющие. Подсчитаем, сколько всего получится проводов. К каждому телефону подключено ровно 5 проводов, то есть степень каждой вершины нашего графа – 5. Чтобы найти число проводов, надо просуммировать степени всех вершин графа и полученный результат разделить на 2 (т.к. каждый провод имеет два конца, то при суммировании степеней каждый провод будет взят 2 раза).

Но тогда количество проводов получится разным $15 \cdot \frac{5}{2} = 37,5$. Но это число нецелое. Значит наше предположение о том, что можно соединить каждый телефон ровно с пятью другими, оказалось неверным.

Ответ. Соединить телефоны таким образом невозможно.

Теорема: Любой граф содержит четное число нечетных вершин.

Доказательство: Количество ребер графа равно половине суммы степеней его вершин. Так как количество ребер должно быть целым числом,

то сумма степеней вершин должна быть четной. А это возможно только в том случае, если граф содержит четное число нечетных вершин.

Связность графа

Есть еще одно важное понятие, относящееся к графам – понятие связности.

Граф называется *связным*, если любые две его вершины можно соединить *путем*, то есть непрерывной последовательностью ребер. Существует целый ряд задач, решение которых основано на понятии связности графа.

Задача №4. В стране N 15 городов, каждый из городов соединен железной дорогой не менее чем с семью другими. Докажите, что из каждого города можно добраться в любой другой.

Доказательство: Рассмотрим два произвольных A и B города и допустим, что между ними нет пути. Каждый из них соединен железной дорогой не менее чем с семью другими, причем нет такого города, который был бы соединен с обоими рассматриваемыми городами (в противном случае существовал бы путь из A в B). Нарисуем часть графа, соответствующую этим городам:




Рис. 5.

Теперь явно видно, что мы получили не менее различных 16 городов, что противоречит условию задачи. Значит утверждение доказано от противного.

Если принять во внимание предыдущее определение, то утверждение задачи можно переформулировать и по-другому: «Доказать, что граф дорог страны N связан».

Теперь вы знаете, как выглядит связный граф. Несвязный граф имеет вид нескольких «кусков», каждый из которых – либо отдельная вершина без ребер, либо связный граф. Пример несвязного графа вы видите на рисунке:




Рис. 6.

Каждый такой отдельный кусок называется *компонентой связности графа*. Каждая компонента связности представляет собой связный граф и для нее выполняются все утверждения, которые мы доказали для связных графов.

Рассмотрим пример задачи, в которой используется компонента связности:

Задача №5. В Тридевятом царстве только один вид транспорта – поезд. Из столицы выходит 21 дорога, из города Дальний – одна, а из всех остальных городов, – по 20. Докажите, что из столицы можно доехать в город Дальний.

Доказательство: Понятно, что если нарисовать граф железных дорог Царства, то он может быть несвязным. Рассмотрим компоненту связности, которая включает в себя столицу Царства. Из столицы выходит 21 дорога, а из любых других городов, кроме города Дальний – по 20, поэтому, чтобы выполнялся закон о четном числе нечетных вершин необходимо, чтобы и город Дальний входил в эту же самую компоненту связности. А так как компонента связности – связный граф, то из столицы существует путь по дорогам до города Дальний, что и требовалось доказать.

Графы Эйлера

Вы наверняка сталкивались с задачами, в которых требуется нарисовать какую-либо фигуру, не отрывая карандаш от бумаги и проводя каждую линию только один раз. Оказывается, что такая задача не всегда разрешима, то есть существуют фигуры, которые указанным способом нарисовать нельзя. Вопрос разрешимости таких задач также входит в теорию графов. Впервые его исследовал в 1736 году великий немецкий математик Леонард Эйлер, решая задачу о Кенигсбергских мостах. Поэтому графы, которые можно нарисовать указанным способом, называются Эйлеровыми графами.

Задача №6. Можно ли нарисовать изображенный на рисунке граф не отрывая карандаш от бумаги и проводя каждое ребро ровно один раз?




Рис.7.

Решение: Если мы будем рисовать граф так, как сказано в условии, то в каждую вершину, кроме начальной и конечной, мы войдем столько же раз, сколько выйдем из нее. То есть все вершины графа, кроме двух должны быть четными. В нашем же графе имеется три нечетные вершины, поэтому его нельзя нарисовать указанным в условии способом.

Сейчас мы доказали теорему об Эйлеровых графах:

Теорема: Эйлеров граф должен иметь не более двух нечетных вершин.

Задания для самостоятельного решения

1. В стране N 100 вокзалов. От любого вокзала до любого другого можно проехать. Через один из вокзалов хотят закрыть проезд так, чтобы между всеми остальными был возможен проезд. Докажите, что такой вокзал найдется.

2. В стране Z каждые 2 города соединены железными дорогами с односторонним движением. Докажите, что существует город, из которого можно проехать в любой другой не более, чем по двум железнодорожным путям.

3. На сайте сотрудников железных дорог ведется активная переписка, в которой участвуют пять человек. Докажите, что если каждый из пяти человек переписывается только с двумя другими, то не найдется трех человек, которые все переписываются между собой.

4. На банкет, посвященному дню рождения ОАО «РЖД», приехало множество людей из различных уголков страны. Один из гостей сказал: «Здесь не найдется девяти человек таких, чтобы каждый был знаком ровно с тремя другими». Прав ли он?

Практическая работа 3 (4ч).

Применение производной к решению прикладных задач.

Цель работы: научиться решать задачи на применение производной.

Краткая теория.

1. Применение производной в физике.

Физический смысл производной: производная есть скорость изменения физической величины.

Пример . Найти мгновенную скорость при свободном падении.

Решение. Закон свободного падения имеет вид $x = \frac{gt^2}{2}$. Мгновенная скорость при свободном падении равна: $v_{\text{мгн}} = x'$, т.е. $v_{\text{мгн}} = gt$.

Пример1. Пусть $q = q(t)$ - количество электричества, протекающее через поперечное сечение проводника за время t . Найдём силу тока в данный момент времени t

Решение. Сила тока есть производная от количества электричества, как функции от времени, т.е. $I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = q'(t)$,

Пример 2. Пусть дан неоднородный стержень длины l , $m = m(x)$ - масса части стержня длины x (один из концов стержня принимается за начало отсчета). Найдём линейную плотность стержня в данной точке x .

Решение. Линейная плотность стержня в данной точке есть производная массы стержня как функции от его длины: $\rho = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = m'(x)$,

Плотность стержня есть скорость изменения массы части стержня как функции его длины.

Решение физических задач, связанных с нахождением скорости, ускорения и т.д.

Пример 1. Дано уравнение прямолинейного движения тела: $S = 3t^2 + 2$, где S - путь, пройденный телом, м; t - время, с. Найдите скорость тела в момент времени $t=1$ с.

Решение. Скорость это производная пути по времени. Значит: $V = S' = 6t$
Подставив значение времени получим: $V(1) = 6 \text{ м/с}$

Пример 2. Точка движется по закону $S = \frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 2$. Найти скорость и ускорение через 2 с после начала движения (движение считать прямолинейным).

Решение. Скорость это производная пути по времени. Значит:
 $V = S' = t^3 + t^2 + t$. Подставив значение времени получим $V(2) = 16 \text{ м/с}$

Пример 3. Тело движется прямолинейно по закону $S(t) = 1 + t + t^2$. Найти его кинетическую энергию через 5 с после начала движения, если масса тела 3 кг.

Решение. Формула нахождения кинетической энергии: $E_k = \frac{mv^2}{2}$. Найдем скорость тела. $V = S' = 2t + 1$, $V(5) = 11$. Кинетическая энергия тела составит:
 $E_k = \frac{3 * 121}{2} = 181,5$.

2. Решение экономических задач с помощью производной.

Пример 1. Выбрать оптимальный объем производства N фирмой, функция прибыли которой может быть смоделирована зависимостью: $F(q) = q^2 - 8q + 10$.

Решение: Оптимальный объём производства есть производная от функции прибыли, т.е. $N = F(q)$

$$F'(q) = R'(q) - C'(q) = 2q - 8 = 0 \rightarrow q_{\text{extr}} = 4$$

При $q < q_{\text{extr}} = 4 \rightarrow F'(q) < 0$ и прибыль убывает

При $q > q_{\text{extr}} = 4 \rightarrow F'(q) > 0$ и прибыль возрастает

При $q = 4$ прибыль принимает минимальное значение.

Ход работы.

1 вариант.

1. Дано уравнение прямолинейного движения тела: $S = 2t^3 - 8t + 2$, где S- путь, пройденный телом, м; t- время, с. Найдите скорость тела в момент времени $t = 3$ с.

2. Точка движется по закону $S = \frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 2$. Найти скорость и ускорение через 3 с после начала движения (движение считать прямолинейным).
3. Пусть $q = t^3 - 4t + 8$ - количество электричества, протекающее через поперечное сечение проводника за время t . Найдем силу тока в данный момент времени $t = 2$ с.
4. Пусть дан неоднородный стержень длины l , масса неоднородного стержня меняется по закону: $m = 2x^3 - 8x + 12$. Найти линейную плотность стержня в данной точке $x = 4$
5. Прибыль фирмы задана зависимостью: $F(q) = 4q^2 - 4q + 12$. Найти оптимальный объём производства N фирмы.

2 вариант.

1. Дано уравнение прямолинейного движения тела: $S = 3t^2 - 5t + 2$, где S - путь, пройденный телом, м; t - время, с. Найдите скорость тела в момент времени $t = 4$ с.
2. Точка движется по закону $S = \frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 2$. Найти скорость и ускорение через 4 с после начала движения (движение считать прямолинейным).
3. Пусть $q = 3t^2 - 5t + 8$ - количество электричества, протекающее через поперечное сечение проводника за время t . Найдем силу тока в данный момент времени $t = 3$ с.
4. Пусть дан неоднородный стержень длины l , масса неоднородного стержня меняется по закону: $m = 3x^2 - 5x + 12$. Найти линейную плотность стержня в данной точке $x = 4$
5. Прибыль фирмы задана зависимостью : $F(q) = 5q^2 - 5q + 12$. Найти оптимальный объём производства N фирмы.

Практическое занятие 4 (4ч).

Применение интеграла к решению прикладных задач.

Цель: ознакомиться с применением интеграла для решения задач и выполнить задания.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ.

Пусть требуется найти значение какой – либо геометрической или физической величины A (площадь фигуры, объем тела, давление жидкости на вертикальную пластину и т. д.), связанной с отрезком $[a, b]$ изменения переменной x . Для нахождения этой величины A можно руководствоваться методом интегральных сумм. Искомая величина $A = \int_a^b f(x)dx$.

Работа переменной силы. Пусть материальная точка M перемещается вдоль оси Ox под действием переменной силы $F = F(x)$, направленной параллельно этой оси. Работа, произведенная силой при перемещении точки M из положения $x = a$ в положение $x = b$, находится по формуле: $A = \int_a^b F(x)dx$.

Пример. Какую работу нужно затратить, чтобы растянуть пружину на 0,05 м, если сила 100 Н растягивает пружину на 0,01 м?

Решение: По закону Гука упругая сила, растягивающая пружину, пропорциональна этому растяжению x , т. е. $F = kx$, где k — коэффициент пропорциональности. Согласно условию задачи, сила $F = 100$ Н растягивает пружину на $x = 0,01$ м; следовательно, $100 = k \cdot 0,01$, откуда $k = 10000$; следовательно, $F = 10000x$.

Искомая работа $A = \int_a^b F(x)dx = \int_0^{0,05} 10000x dx = 5000x^2 \Big|_0^{0,05} = 12,5$ (ДЖ).

Путь, пройденный телом. Пусть материальная точка перемещается по прямой с переменной скоростью $v = v(t)$. Тогда путь S , пройденный ею за промежуток времени от t_1 до t_2 . Можно определить по формуле: $S = \int_{t_1}^{t_2} v(t)dt$

Пример. Найти путь, пройденный телом за 4 секунды от начала движения, если скорость тела $v(t) = 10t + 2$ (м/с).

Решение: Если $v(t) = 10t + 2$ (м/с), то путь, пройденный телом от начала движения ($t = 0$) до конца 4-й секунды, равен $S = \int_0^4 (10t + 2)dt = 5t^2 \Big|_0^4 + 2t \Big|_0^4 = 80 + 8 = 88$ (м).

Вычисление массы стержня переменной плотности.

Будем считать, что отрезок $[a; b]$ оси Ox имеет массу с переменной линейной плотностью $\rho(x) \geq 0$, где $\rho(x)$ - непрерывная на отрезке $[a; b]$ функция.

$$M = \int_a^b \rho(x) dx$$

Общая масса этого отрезка

Пример. Вычислить массу стержня на отрезке от 0 до 2, если его плотность задаётся функцией $\rho(x) = x + 1$

Решение: $M = \int_a^b \rho(x) dx$, $M = \int_0^2 (x+1) dx = \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^2 = 4$

Задания.

1 вариант.

1. Какую работу нужно затратить, чтобы растянуть пружину на 0,08 м, если сила 120 Н растягивает пружину на 0,04 м?
2. Найти путь, пройденный телом за 4 секунды от начала движения, если скорость тела $V(t) = 8t - 3$ (м/с).
3. Вычислить массу стержня на отрезке от 2 до 5, если его плотность задаётся функцией $\rho(x) = 2x - 1$

2 вариант.

1. Какую работу нужно затратить, чтобы растянуть пружину на 0,08 м, если сила 120 Н растягивает пружину на 0,04 м?
2. Найти путь, пройденный телом за 4 секунды от начала движения, если скорость тела $V(t) = 8t - 3$ (м/с).
3. Вычислить массу стержня на отрезке от 2 до 5, если его плотность задаётся функцией $\rho(x) = 2x - 1$

Практическое занятие 5(2ч).

Применение обыкновенных дифференциальных уравнений при решении прикладных задач.

Цель: сформировать практические умения применять теорию дифференциальных уравнений при решении прикладных задач.

Пример 1: Найти закон движения тела по оси Ox , если оно начало двигаться из точки $M(4;0)$ со скоростью $v = 2t + 3t^2$.

Решение: При прямолинейном движении скорость есть производная от пути по времени. Обозначив путь через x , имеем $v = \frac{dx}{dt}$; тогда $\frac{dx}{dt} = 2t + 3t^2$, или $dx = (2t + 3t^2)dt$. Проинтегрировав, получим $x = t^2 + t^3 + C$. Так как $x = 4$ при $t = 0$, то, подставив эти значения в общее решение, находим $C = 4$. Итак, закон движения тела имеет вид $x = t^2 + t^3 + 4$.

Пример 2: Дано уравнение скорости движения локомотива
 $v = 2t^2 - 2t + 1$ (М/с).

Найти уравнение пути, если локомотив за первые 2с прошел путь 11 м.

Решение: При прямолинейном движении скорость есть производная от пути по времени. Получили дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными.

$$\begin{aligned}v &= s', \\v &= \frac{ds}{dt}, \\2t^2 - 2t + 1 &= \frac{ds}{dt} \quad \text{или} \quad (2t^2 - 2t + 1) \cdot dt = ds\end{aligned}$$

Проинтегрировав, получим $s = t^3 - t^2 + t + C$. Так как за первые 2 с локомотив прошел путь 11 м, то, подставив эти значения в общее решение, находим $C = 5$. Следовательно, уравнение пути локомотива имеет вид: $s = t^3 - t^2 + t + 5$.

Пример 3: Составить уравнение кривой, проходящей через точку $M(2;-3)$ и имеющей касательную с угловым коэффициентом $4x - 3$.

Решение: Согласно условию, имеем

$$\frac{dy}{dx} = 4x - 3, \text{ или } dy = (4x - 3)dx.$$

Проинтегрировав, получим $y = 2x^2 - 3x + C$. Используя начальные условия $x = 2$ и $y = -3$, находим $C = -5$. Следовательно, искомое уравнение имеет вид $y = 2x^2 - 3x - 5$.

Пример 4: Вращающийся в жидкости диск замедляет свою угловую скорость за счет трения, причем сила трения пропорциональна угловой скорости. Найти: 1) скорость вращения диска в момент $t = 120$ с, если при $t = 0$ он вращался со скоростью 12 рад/с , а при $t = 10$ с его скорость стала 8 рад/с ; 2) момент времени, когда скорость вращения диска окажется равной 1 рад/с .

Решение: Пусть ω – угловая скорость вращения диска в момент времени t тогда замедления вращения диска под воздействием силы трения равно $\frac{d\omega}{dt}$.

Согласно условию, $\frac{d\omega}{dt} = k\omega$, где k – коэффициент пропорциональности. Разделив переменные и интегрируя, получим

$$\frac{d\omega}{\omega} = k dt, \int \frac{d\omega}{\omega} = k \int dt, \ln \omega = kt + C,$$

откуда $\omega = e^{kt+C} = e^{kt} \cdot e^C$, или

$$\omega = C_1 \cdot e^{kt}. \quad (1)$$

Найдем постоянную величину C_1 при начальных условиях $\omega = 12 \text{ рад/с}$ при $t = 0$. Подставив эти значения в равенство (1), имеем $12 = C_1 \cdot e^{k \cdot 0}$, т.е. $12 = C_1$. Таким образом,

$$\omega = 12 \cdot e^{kt}. \quad (2)$$

Найдем числовое значение k по следующим данным: $t = 10$ с и $\omega = 8 \text{ рад/с}$. Подставим эти значения в равенство (2):

$$8 = 12 \cdot e^{k \cdot 10},$$

$$e^{10k} = \frac{2}{3}, \quad 10k \lg e = \lg 2 - \lg 3,$$

$$k = \frac{\lg 2 - \lg 3}{10 \lg e} = -\frac{\lg 3 - \lg 2}{10 \lg e} = \frac{0,4771 - 0,3010}{10 \cdot 0,4343} = -0,0405.$$

Подставив значение k в равенство (2), получим

$$\omega = 12 \cdot e^{-0,0405t}. \quad (3)$$

Найдем скорость вращения диска в момент времени $t = 120$ с. Подставим в равенство (3) значение $t = 120$:

$$\omega = 12 \cdot e^{-0,0405 \cdot 120} = 12 \cdot e^{-4,9} = 0,09(\text{rad/c}).$$

Определяем, в какой момент времени диск будет вращаться со скоростью $1(\text{rad/c})$. Подставив в соотношение (3) значение $\omega = 1$, имеем

$$1 = 12 \cdot e^{-0,0405t}, e^{-0,0405t} = \frac{1}{12}; -0,0405t \lg e = \lg 1 - \lg 12,$$

$$t = \frac{\lg 12}{0,0405 \lg e} = 61(\text{c}).$$

Задания для самостоятельного решения

1. Найдите закон движения тела по оси Oy , если оно начало двигаться из точки $M(0;6)$ со скоростью $v = 4t - 6t^2$.
2. Дано уравнение скорости движения локомотива $v = 3t^2 - 4t + 2(\text{M/c})$. Составьте уравнение пути поезда, если локомотив прошел за первые 4 с путь, равный 20 м.
3. Составить уравнение кривой, проходящей через точку $M(2;-1)$ и имеющей касательную с угловым коэффициентом $k = \frac{1}{2y}$.
4. Составить уравнение кривой, проходящей через точку $(1;4)$, для которой отрезок касательной между точкой касания и осью абсцисс делится пополам в точке пересечения с осью Oy .

Практическое занятие 6 (2ч).

Решение прикладных задач с применением числовых рядов.

Цель: сформировать практические умения и навыки применять теорию числовых рядов при решении задач.

Числовой ряд – это выражение вида $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$. Числа $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ называются *членами ряда*. Они образуют бесконечную последовательность.

Общий член ряда – это член a_n с произвольным номером. Сокращенно ряд обозначают следующим образом: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Частичные суммы ряда – это суммы конечного числа членов ряда.

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1, \\ S_2 &= a_1 + a_2, \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3, \\ &\dots \\ S_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n. \end{aligned}$$

Пример 1: Дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+6}{5}$. Найти S_2, S_4 .

Решение: 1) $S_2 = a_1 + a_2, S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$.

$$a_1 = \frac{3 \cdot 1 + 6}{5} = \frac{9}{5} = 1,8,$$

$$2) a_2 = \frac{3 \cdot 2 + 6}{5} = \frac{12}{5} = 2,4, \quad S_2 = 1,8 + 2,4 = 4,2, \\ S_4 = 1,8 + 2,4 + 3 + 3,6 = 10,8.$$

$$a_3 = \frac{3 \cdot 3 + 6}{5} = \frac{15}{5} = 3,$$

$$a_4 = \frac{3 \cdot 4 + 6}{5} = \frac{18}{5} = 3,6$$

Ответ: $S_2 = 4,2, S_4 = 10,8$.

Пример 2: Найти сумму членов ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)}$.

Решение: Находим частичные суммы членов ряда:

$$S_1 = u_1 = \frac{1}{3}; \quad S_2 = u_1 + u_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{15} = \frac{2}{5}; \quad S_3 = u_1 + u_2 + u_3 = \frac{2}{5} + \frac{1}{35} = \frac{3}{7};$$

$$S_4 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = \frac{3}{7} + \frac{1}{63} = \frac{4}{9}; \dots$$

Запишем последовательность частичных сумм: $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \frac{4}{9}, \dots, \frac{n}{2n+1}, \dots$

Общий член этой последовательности есть $\frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2 + \frac{1}{n}}$.

Следовательно,

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2}. \text{ Итак, ряд сходится и его сумма равна } \frac{1}{2}.$$

Признаки сходимости ряда

1. Необходимый признак сходимости: Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то общий член ряда a_n стремится к нулю при неограниченном возрастании n (при $n \rightarrow \infty$). $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Пример 3. Исследовать ряд по необходимому признаку $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1000n+5}$.

Решение: Находим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1000n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n}}{\frac{1000n}{n} + \frac{5}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1000 + \frac{5}{n}} = \frac{1}{1000+0} = \frac{1}{1000} \neq 0.$$

Следовательно, ряд расходится.

2. Признак Даламбера: Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ с положительными членами. Если для этого ряда существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = p$, то при $p < 1$ ряд сходится, а при $p > 1$ ряд расходится. (При $p = 1$ вопрос о сходимости ряда остается нерешенным в этом случае требуется исследовать ряд с помощью других методов).

Пример 4: Исследовать ряд на сходимость, применяя признак Даламбера:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{3^{n+5}}.$$

Решение: Преобразуем выражение $\frac{a_{n+1}}{a_n}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^5 \cdot 3^{n+1}}{3^{n+1+5} \cdot n^5} = \frac{(n+1)^5}{n^5} \cdot \frac{3^{n+1}}{3^{n+6}} = \frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5 = \frac{1}{3} < 1$. Ряд сходится по признаку Даламбера.

3. Признак Коши: Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ с положительными членами. Если для этого ряда существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$, то при $q < 1$ ряд сходится, а при $q > 1$ ряд расходится. (При $q = 1$ вопрос о сходимости ряда остается нерешенным в этом случае требуется исследовать ряд с помощью других методов).

Пример 4. Исследовать ряд по признаку Коши $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{2n+1} \right)^n$.

Решение:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n-1}{2n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{2n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n} - \frac{1}{n}}{\frac{2n}{n} + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{n}}{2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2} < 1$$

Следовательно, ряд сходится.

Задания для самостоятельного решения:

Задание 1. Найдите первые пять членов ряда по его заданному общему члену. Найдите частичные суммы S_2 и S_4 .

$$1) u_n = \frac{2n}{2n-1}; 2) u_n = \frac{2^n + 3}{2^{n+1}}; 3) u_n = \frac{1 + (-1)^{n+1}}{n}; 4) u_n = (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{2n+1}.$$

Задание 2. Исследовать ряд на сходимость. Самостоятельно определить и указать признак сходимости

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}; 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}; 3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 - 2n^2 + 1}{5n^4 - 8n + 2}; 4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^3 - 1}{2n^3 + 1} \right)^n.$$

Практическое занятие 7(2ч).

Решение прикладных задач с использованием комбинаторики.

Цель: закрепить практические навыки применения формул комбинаторики при решении прикладных ситуационных задач.

ПЕРЕСТАНОВКИ

Перестановками из n -элементов называются такие соединения, которые отличаются друг от друга только порядком расположения.

Обозначение числа перестановок из n -элементов:

$P_n = n!$, n – количество элементов,

$n!$ («эн факториал») = $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$.

РАЗМЕЩЕНИЯ

1) Теорема о выборе двух элементов с учетом их порядка

Если множество состоит из n элементов и требуется выбрать из них два элемента, учитывая их порядок, то такой выбор можно произвести $n(n-1)$ способами:

$A_n^2 = n(n-1)$, где A_n^2 - число размещений из n элементов по 2.

2) **Размещениями из m элементов по n** называются такие соединения, которые содержат n элементов из множества m элементов и отличаются друг от друга либо самими элементами (состав), либо порядком их расположения.

Обозначение числа размещений: $A_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$, m – общее количество

элементов, n – количество отбираемых элементов.

СОЧЕТАНИЯ

В случаях, в которых порядок не важен, используем *сочетания*.

1) Теорема о выборе двух элементов без учета их порядка

Если множество состоит из n элементов и требуется выбрать два элемента без учета их порядка, то такой выбор можно произвести $\frac{n(n-1)}{2}$

способами:

$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$, где C_n^2 («цэ из эн по два») - **число сочетаний из n элементов по**

2 (число всех выборов двух элементов *без учета их порядка* из n данных элементов).

2) Число сочетаний из n элементов по k :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad n! \text{ («эн факториал») } = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n.$$

3) Формула для упрощения вычислений:

$$C_n^k = C_n^{n-k} \quad C_{15}^{13} = C_{15}^2 = \frac{15 \cdot 14}{2!} = 105.$$

4) Количество выборов n элементов из n элементов:

$$C_n^n = 1, \text{ т.к.}$$

такой выбор единственный – надо взять все множество целиком.

5) Количество выборов 0 элементов из n элементов:

$$C_n^0 = 1,$$

т.к. такой «выбор» единственный - ничего не выбираем.

Пример 1: Сколькими способами могут быть расставлены 8 участниц финального забега Спартакиады на 8 беговых дорожках?

Решение: Число способов равно числу перестановок из 8 элементов. По формуле числа перестановок находим, что

$$P_8 = 8! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 = 40320.$$

Пример 2: Группа 21 ТПС в 3-ем семестре изучают 13 предметов. Сколькими способами можно составить расписание на один день, чтобы в нем было 3 различных предмета?

Решение: Любое расписание на один день, составленное из 3 различных предметов, отличается от другого либо предметами, либо порядком следования предметов. Значит, в этом примере речь идет о размещениях из 13 элементов по 3.

$$A_{13}^3 = \frac{13!}{(13-3)!} = \frac{13!}{10!} = 11 \cdot 12 \cdot 13 = 1716.$$

Пример 3: Из 20 студентов учебной группы надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?

Решение: Каждый выбор отличается от другого хотя бы одним дежурным. Значит, здесь речь идет о сочетаниях из 20 элементов по 3.

Имеем:

$$C_{20}^3 = \frac{20!}{(20-3)! \cdot 3!} = \frac{20!}{17! \cdot 3!} = \frac{18 \cdot 19 \cdot 20}{6} = 3 \cdot 19 \cdot 20 = 1140.$$

Пример 4: Из ящика с инструментами, в котором лежит 9 напильников и 6 гаечных ключей, надо выбрать 3 напильника и 2 гаечных ключа. Сколькими способами можно мастер производственного обучения может сделать такой выбор?

Решение: Выбрать 3 напильника из 9 можно C_9^3 способами, а выбрать 2 гаечных ключа из 6 можно C_6^2 способами. Так как при каждом выборе напильников гаечные ключи можно выбрать C_6^2 способами, то сделать выбор инструментов, о которых говорится в задаче, можно $C_9^3 \cdot C_6^2$ способами.

Имеем:

$$C_9^3 \cdot C_6^2 = \frac{9!}{6! \cdot 3!} \cdot \frac{6!}{4! \cdot 2!} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 6}{6 \cdot 2} = 7 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 5 = 1260.$$

Задания для самостоятельного решения

1. Сколькими способами могут быть расставлены 5 участниц финального забега Спартакиады на 5-ти беговых дорожках?
2. Вычислить P_6 , A_{12}^6 , C_{11}^5 .
3. Сократить дробь $\frac{12!}{6!} \cdot \frac{(20-11)!}{4!} \cdot \frac{(7+5)! \cdot 3!}{11!}$.
4. На станции 7 запасных путей. Сколькими способами можно расставить на них 3 поезда?
5. Сколько существует перестановок букв слова «машинист», в которых буквы **м**, **а**, **ш** стоят рядом?
6. Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 книг – это учебники по конструкции и ремонту вагонов, так, чтобы учебники стояли рядом в произвольном порядке?
7. В ВТЖТ организованы соревнования по футболу, в которых участвуют 12 студенческих команд. Каждая команда провела с каждой из остальных по одной игре на своем поле и по одной игре на поле соперника. Сколько всего игр было сыграно?

Практическое занятие 8 (2ч)

Решение прикладных задач на нахождение вероятности события.

Цель: закрепить практические навыки применения формул теории вероятностей при решении прикладных задач.

Краткие теоретические сведения

Вероятностью события A называют отношение числа благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную группу. Итак, вероятность события A определяется формулой

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

Вероятность любого события удовлетворяет двойному неравенству

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Теорема сложения вероятностей несовместных событий.

Вероятность появления одного из нескольких попарно несовместных событий, безразлично какого, равна сумме вероятностей этих событий:

$$P(A + B) = P(A) + P(B);$$

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Теорема сложения вероятностей совместных событий. Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

События называются **противоположными**, если в условиях испытания они, являясь его исходами, несовместны.

Событие, противоположное событию A (то есть не наступление события A), обозначают \bar{A} . Сумма вероятностей двух противоположных событий равна единице:

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1.$$

Вероятность наступления события A , вычисленная в предположении, что событие B уже произошло, называется **условной вероятностью** события A при условии B и обозначается $P_B(A)$.

События A, B, C, \dots называются **независимыми в совокупности**, если вероятность каждого из них не меняется в связи с наступлением или не наступлением других событий по отдельности или в любой их комбинации.

Если A и B – независимые события, то

$$P(B) - P_A(B) = P_{\bar{A}}(B).$$

Теорема умножения вероятностей независимых событий.

Вероятность совместного появления двух независимых событий равна произведению вероятностей этих событий:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Вероятность появления нескольких событий, независимых в совокупности, вычисляется по формуле

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

Теорема умножения вероятностей зависимых событий. Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна произведению одного из них на условную вероятность второго:

$$P(AB) = P(A) \cdot P_A(B) = P(B) \cdot P_B(A).$$

Пример 1. При перевозке ящика, в котором содержались 21 стандартная и 10 нестандартных деталей, утеряна одна деталь, причем неизвестно какая. Наудачу извлеченная (после перевозки) из ящика деталь оказалась стандартной. Найти вероятность того, что была утеряна: а) стандартная деталь; б) нестандартная деталь.

Решение: а) Извлеченная стандартная деталь не могла быть утеряна; могла быть потеряна любая из остальных 30 деталей ($21+10 - 1 = 30$), причем среди них было 20 стандартных ($21 - 1 = 20$). Вероятность того, что была потеряна стандартная деталь, $P = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$.

б) Среди 30 деталей, каждая из которых могла быть утеряна, было 10 нестандартных. Вероятность того, что потеряна нестандартная деталь, $P = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$.

Пример 2: В распределительном пункте (РП) установлено шесть автоматических выключателей. Нормальная работа потребителей обеспечивается при их исправном состоянии. При монтаже РП выключатели выбирались из партии объемом в 900 штук, в которой было 850 исправных выключателей и 50 неисправных. Найти вероятность исправной работы РП.

Решение: Общее число элементарных исходов равно числу сочетаний из 900 элементов по 6, то есть C_{900}^6 .

Число исходов, благоприятствующих исправной работе распределительного пункта, то есть C_{850}^6 .

Искомая вероятность равна отношению числа исходов, благоприятствующих интересующему нас событию, к общему числу возможных элементарных исходов: $P = \frac{C_{850}^6}{C_{900}^6} \approx 0,74$.

Пример 3. В билете 3 раздела. Из 40 вопросов первого раздела студент знает 30 вопросов, из 30 вопросов второго – 15, из 30 вопросов третьего – 10. Определить вероятность правильного ответа студента по билету.

Решение: Учитывая, что ответ на каждые разделы есть независимые события A_1, A_2 и A_3 , а их вероятности соответственно равны:

$$P(A_1) = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}; P(A_2) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}; P(A_3) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$$

Тогда вероятность правильного ответа на билет $P(B)$, можно найти по формуле:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = 0,125.$$

Пример 4. На склад ежедневно поступают детали с трех предприятий. С первого – 30 деталей, со второго – 20 и с третьего – 40. Установлено, что 2, 4 и % продукции этих предприятий, соответственно, имеют дефекты. Найти вероятность того, что взятая наудачу деталь будет дефектна.

Решение: Обозначим: B – взятая наугад деталь дефектна; A_1 – деталь изготовлена на первом предприятии; A_2 – деталь изготовлена на втором предприятии; A_3 – деталь изготовлена на третьем предприятии. События A_1, A_2 и A_3 образуют полную группу несовместных событий и

$$P(A_1) = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}; P(A_2) = \frac{20}{90} = \frac{2}{9}; P(A_3) = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}.$$

Условные вероятности события B равны:

$$P_{A_1}(B) = 0,02; P_{A_2}(B) = 0,04; P_{A_3}(B) = 0,05.$$

Тогда

$$P(B) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(B) + P(A_2) \cdot P_{A_2}(B) + P(A_3) \cdot P_{A_3}(B) = \frac{1}{3} \cdot 0,02 + \frac{2}{9} \cdot 0,04 + \frac{4}{9} \cdot 0,05 = 0,0378.$$

Задания для самостоятельного решения

1. Из букв «осмотрщик» наугад выбирается одна буква. Какова вероятность того, что выбранная буква будет: А – согласной; В – гласной; С – буква «о».
2. Отдел дефектоскопии ремонтно-локомотивного депо проверяет колесные пары на наличие дефектов, соблюдая нормы безопасных условий труда. Вероятность того, что колесная пара без дефектов, равна 0,7. Найти вероятность того, что из двух проверенных колесных пар только одна без дефектов.
3. В вагонное депо поступили вагоны, 60 % которых поставило первое предприятие, 25 % – второе и 15 % – третье. Какова вероятность того, что вагон изготовлен на первом или третьем предприятии.
4. Студент пришел на зачет, зная из 30 вопросов только 24. Какова вероятность сдать зачет, если после отказа отвечать на вопрос преподаватель задает еще один вопрос?
5. Для сигнализации об аварии на участке пути установлены два независимо работающих сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,85 для первого сигнализатора и 0,8 для

второго. Найти вероятность того, что при аварии сработает только один сигнализатор.